

Информация для потребителей – просьба прочитать внимательно!

Лиотон 1000® гель

Для наружного применения

СОСТАВ

В 100 г геля содержится: 100 000 МЕ гепарина.

Прочие компоненты: карбомер 940, метил-п-гидроксibenзоат, пропилен-п-гидроксibenзоат, масло неролиевое (масло померанцевых цветов), масло лавандовое, спирт этиловый, триэтанолламин, вода.

СВОЙСТВА

Лиотон 1000® гель представляет собой препарат на основе гепарина в форме геля для наружного применения; поэтому он пригоден к применению для однокомпонентной или комбинированной системной терапии патологических, воспалительных или травматических состояний, на которые этот препарат, введенный чрескожным путем, оказывает благоприятное антиэкссудативное, противоотечное, противосвертывающее действие и способствует рассасыванию инфильтратов.

В связи с этим Лиотон 1000® гель отличается широкой сферой применения, охватывающей, прежде всего, лечение варикозной болезни (терапия и сосудистая хирургия), а также лечение травм и ушибов (травматология / ортопедия).

Препарат отличается очень хорошей как местной, так и общей переносимостью.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Лечение поверхностных заболеваний вен, таких как варикозные синдромы и связанные с ними осложнения, флеботромбоз, тромбофлебит, поверхностный перифлебит, варикозные язвы. Послеоперационный варикофлебит; осложнения после удаления подкожной вены ноги.

Травмы и ушибы; инфильтраты и локализованные отеки; подкожные гематомы. Травматические нарушения мышечно-сухожильных и капсульно-связочных структур.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

От одного до трех раз в день на пораженный участок кожи наносят 3 – 10 см геля и осторожно втирают в кожу.

Из-за ограниченного опыта применения препарата у детей и недостаточности имеющихся данных исследований использовать этот препарат при лечении детей не следует.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лиотон 1000® гель не следует применять при известной повышенной чувствительности к гепарину или к любому другому компоненту препарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При наличии геморрагических симптомов следует тщательно взвесить возможность применения препарата Лиотон 1000® гель.

Лиотон 1000® гель не следует применять при кровотечениях, на открытых ранах или на слизистой оболочке, а также на инфицированных участках при наличии гнойных процессов.

Лиотон 1000® гель содержит в качестве вспомогательных веществ метил-п-гидроксibenзоат и пропил-п-гидроксibenзоат, поэтому его не следует применять у пациентов с аллергией на парабены.

Беременность и кормление грудью

Специфических данных по применению препарата во время беременности и в период кормления грудью не имеется.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ

Применение гепарина может способствовать увеличению протромбинового времени у пациентов, принимающих оральные антикоагулянты.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Аллергические реакции на гепарин после нанесения препарата на кожу очень редки. Однако в отдельных случаях могут наблюдаться реакции повышенной чувствительности, такие как покраснение кожи и зуд, которые быстро исчезают после прекращения применения препарата.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И РАЗМЕР УПАКОВКИ

Тубы с гелем по 30 г

Тубы с гелем по 50 г

Тубы с гелем по 100 г

УКАЗАНИЯ

Не хранить при температуре выше 25 °С.

После истечения срока годности, указанного на упаковке, препарат использовать не следует.

Лекарственное средство хранить в недоступном для детей месте!

Состояние информации: на февраль 2003 г.

Владелец регистрации:

А. Менарини Индустриэ Фармачеутике Риунитэ Срл
50131, Флоренция, Италия

Производитель:

А. Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.Л.
50131 Флоренция, Италия



Дистрибьютор:

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
12489 Берлин, Германия